



Plano de Correção de Rota

Consulte pelo problema percebido. São hipóteses de manejo, não causas confirmadas.

Faz xixi ao lado do tapete

Verifique tamanho, superfície, estabilidade, posição e facilidade de acesso. Reforce acertos no local escolhido.

Acerta um dia e erra no outro

Compare oportunidades, horários, mudanças na casa e supervisão; um episódio isolado não define regressão.

Faz quando ninguém está olhando

Observe se o tutor costumava reagir com broncas. Evite punição e facilite acesso com supervisão gentil.

Escolhe sempre o mesmo canto

Limpe com produto seguro para pets conforme o rótulo; analise acesso e semelhanças entre superfícies.

Ignora o banheiro higiênico

Revise conforto, localização, tamanho e oportunidades; não force o cão a permanecer ali.

Faz logo depois de voltar do passeio

Considere se houve tempo suficiente e um local tranquilo para eliminar. Ofereça novas oportunidades adequadas.

Filhote tem muitos acidentes

Aumente oportunidades apropriadas e supervisão, respeitando idade, descanso e maturação fisiológica.

Cão adulto começou a errar de repente

Priorize avaliação veterinária, especialmente com mudança de sede, frequência, dor ou escapes.

Urina quando recebe visitas ou está assustado

Não corrija com bronca. Investigue possível componente emocional com profissional qualificado.





Ajustes rápidos

Faça uma revisão breve após cada acidente em vez de trocar várias coisas ao mesmo tempo.

Registro de um ajuste

Data: _____

Situação observada

O que ocorreu imediatamente antes?

O destino estava acessível? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sei

Houve sinal físico preocupante? ☐ Sim ☐ Não *(se sim, procure veterinário)*

Camada a revisar: ☐ Ambiente ☐ Relógio ☐ Sinal de Acerto

Um único ajuste que vou testar

O que observarei nos próximos dias?

Três coisas para não fazer

- Não puna, assuste, grite ou esfregue o focinho na urina.
- Não restrinja água nem use confinamento inadequado como punição.
- Não interprete sintomas físicos como desobediência.

Se persistir

Se os episódios continuarem apesar do manejo consistente, ou envolverem marcação, ansiedade, dor ou escapes involuntários, peça apoio profissional individualizado.

